



Pa bryd ga i fynd yn ôl i'r ysgol?



Brechau a heintiau croen	Cyfnod argymhelliad ar gyfer aros i ffwrdd o'r ysgol
Tarwden y traed	Dim
Brech yr ieir	5 diwrnod o ddechrau'r frech
Doluriau annwyd(herpes simplex)	Dim
Brech goch yr Almaen(rwbela)	6 diwrnod o ddechrau'r frech
Llaw,traed a'r geg	Dim
Impetago	Hyd nes bod y clwyfau'n grofennog ac wedi gwella,neu 48 awr ar ol dechrau cael triniaeth wrthfotig.
Y Frech Goch	4 diwrnod ar ol dechrau'r frech
Molluscwm contagioswm	Dim
Tawrden	Nid oes angen gwahardd fel arfer
Brech rosynnaidd (babanod)	Dim
Clefyd crafu (scabies)	Gall y plentyn ddychwelyd ar ôl y driniaeth gyntaf
Y dwymyn goch	Gall y plentyn ddychwelyd ar ôll dechrau triniaeth wrthfotig briodol
Y Foch Goch (Parofeirws B19)	Dim
Yr Eryr	Gwahard os oes rhedlif yn dod o'r frech ac nad oes modd ei gorchuddio yn unig
Dadfennau a ferwcau	Dim

Dolur rhydd a salwch chwydu	Cyfnod argymhelliad ar gyfer aros i ffwrdd o'r ysgol
Dolur rhydd a /neu chwydu	48 awr ar ôl yr achos diwethaf o'r dolur rhydd neu chwydu
E.coli 0157	Dylid ei wahardd am 48 awr o'r achos diwethaf o'r Dolur Rhydd
Teiffoid	Gallai fod angen gwahardd pellach ar gyfer rhai plant hyd nes nad ydynt yn aildaflu mwyach

Heintiau anadol	Cyfnod argymhelliad ar gyfer aros i ffwrdd o'r ysgol
Y Ffliw	Hyd nes bod gwellhad
Twberciwlosis	Ymgynghorwch a'ch UDI bob amser
Y Pas (pertussis)	5 diwrnod o ddechrau triniaeth wrthfotig neu 21 diwrnod o ddechrau'r salwch os nad oes triniaeth wrthfotig.

Heintiau eraill	Cyfnod argymhelliad ar gyfer aros i ffwrdd o'r ysgol
Llid pilen y llygaid	Dim
Llau pen	Dim
Clwy'r pennau (mumps)	5 diwrnod ar ôl dechrau'r chwyddo
Tonsilitis	Dim

